

Guía para la administración

Bolo intravenoso

Antes de comenzar


Antes de comenzar, debe seguir algunos pasos importantes. Consulte el material instructivo sobre el método SASH para obtener más detalles.

1. **Limpie** el área de trabajo.
2. **Lávese** las manos.
3. **Reúna** los suministros:
 - (2) jeringa(s) de lavado precargada(s) con solución salina;
 - (1) jeringa(s) de lavado precargada(s) con heparina (en caso de indicarse);
 - jeringa con el medicamento (a temperatura ambiente);
 - paños con alcohol.
4. **Revise** lo siguiente en la etiqueta del medicamento:
 - El nombre del paciente es correcto.
 - El medicamento y la dosis son correctos.
 - El medicamento no está vencido.
 - El tiempo que toma la infusión.
 - La solución debe ser transparente con un color uniforme y no tener ninguna partícula visible.

Prepare la jeringa con el medicamento

1. Controle que en la jeringa con el medicamento no se hayan formado burbujas de aire. En caso de detectar alguna, quítela del siguiente modo:
 - Extraiga el capuchón protector sin tocar su interior ni la punta de la jeringa con el medicamento.
 - Mantenga la jeringa en posición vertical.
 - Empuje el émbolo de la jeringa suavemente hasta extraer todo el aire; trate de eliminar solo el aire y evite que salgan gotas del medicamento.

2. Vuelva a colocar el capuchón protector en la jeringa con el medicamento.




La punta de la jeringa está esterilizada. No debe tocarla ni permitir que entre en contacto con otras superficies. Si esto sucede, deseche la jeringa según las instrucciones de su enfermero y utilice una nueva. **Tenga en cuenta** que le faltará una dosis y necesitará más medicamento. Póngase en contacto con la farmacia y explique que debe recibir una dosis adicional del medicamento. Solicite orientación.

Lave el catéter


Lave el catéter antes de administrar el medicamento. Consulte el material instructivo sobre el método SASH para obtener más detalles.

Administre el medicamento

1. Con un nuevo paño con alcohol, cubra la parte superior y los costados que se enroscan del tapón de inyección; luego frote durante 15 segundos. Espere 5 segundos hasta que se seque. Asegúrese de no tocar con los dedos la parte superior del tapón de inyección mientras lo limpia.



2. Extraiga el capuchón de la parte superior de la jeringa con el medicamento. Introduzca la jeringa en el tapón de inyección del catéter. Luego, empuje la jeringa y hágala girar en sentido horario hasta que quede fija.



3. Empuje el émbolo de la jeringa lentamente para administrar el medicamento por vía intravenosa según lo indicado:

Durante _____ minuto(s),

administre _____ ml cada _____ segundo(s).

4. Cuando haya administrado toda la dosis, quite la jeringa del tapón de inyección del catéter haciéndola girar en sentido antihorario.
5. Deseche la jeringa con el medicamento según las instrucciones de su enfermero.

Lave el catéter

Lave el catéter luego de la administración del medicamento. Consulte el material instructivo sobre el método SASH para obtener más detalles.

¿Quiere obtener más información?

Mire un video explicativo en nuestro Centro de Recursos, en coramhc.com.

SASH (SASH = S: salinización; A: administración del medicamento; S: salinización; H: heparinización).

Esta información no reemplaza el asesoramiento ni el tratamiento de los médicos. Hable con su médico o proveedor del cuidado de la salud sobre esta información y sobre cualquier duda que tenga relacionada con la salud. Coram no asume responsabilidad alguna por la información brindada ni por ningún diagnóstico o tratamiento que se haga sobre la base de esta información.

© 2023 CVS Health o sus filiales. 75-53178AS 071823 ®